実験 2. 安息香酸メチルの合成

キーワード：Fischerのエステル化法，安息香酸，化学平衡，常圧蒸留

新しい実験操作

加熱還流，抽出，飽和食塩水洗浄，酸性物質と中性物質の分離，液体の乾燥，高沸点化合物の常圧蒸留

Hermann Emil Fischer

1852年10月19日 – 1919年7月15日

インドールの合成, フィッシャー投影式の発案,
エステル化法の発見などの功績がある.
1902年には, ノーベル化学賞を受賞した.

フィッシャー投影式で
表したD-グルコース

Fischer Esterification

- ・少量の強酸触媒を含むアルコール溶液中でカルボン酸を加熱し，エステルを合成する方法.
- ・平衡反応のため反応は定量的には進行しないが，生成する水の除去，アルコールを過剰量用いることで平衡を生成系へずらすことができる.
- ・アルコールを溶媒として過剰に用いるため，メチル，エチル，プロピルおよびブチルエステルの合成に限られる.

Mechanism

Other Methods (1)

酸塩化物を用いる方法

- ・ 不可逆的な反応である。
- ・ 立体障害の影響を強く受ける。
2級アルコールよりも1級アルコールの方が、酸塩化物と反応しやすい。
- ・ HClが発生するため、ピリジンやNaOHなどの塩基を加え、副反応を防ぐ必要がある。

Mechanism

Other Methods (2)

酸無水物を用いる方法

- ・ 酸無水物は酸塩化物よりもゆっくりと反応するが、この2つの反応の種類は同じである。
- ・ 酸無水物として無水酢酸を用いた反応の例では、アスピリンの合成が挙げられる。
(サリチル酸の無水酢酸によるアセチル化)

Mechanism

Reagents

安息香酸 (Benzoic acid)

Mw : 122.12 g/mol
bp : 249 °C
mp : 124 °C
pKa : 4.2
形状 : 無色固体

1832年に、リービッヒらによって構造決定された。

濃硫酸 (Sulfuric acid)

Mw : 98.08 g/mol
bp : 290 °C
mp : 10.49 °C
pKa : - 5.0
形状 : 無色無臭
油状液体

強い吸湿性と脱水作用を持つ。
皮膚に付着した場合には、すばやく
多量の水で洗い流す。

メタノール (Methanol)

Mw : 32.04 g/mol
bp : 64.7 °C
mp : - 97.8 °C
pKa : 15.5
形状 : 無色液体

揮発性が高く、メタノールが入った容器に火を近づけると爆発する恐れあり。
また、メタノールの炎は薄青色であるが、非常に透明感があり視認しにくい。

実験操作

安息香酸 10.0g メタノール 25ml

- 1) 氷冷下、濃硫酸 3ml を加える
- 2) 直火で1時間還流する
- 3) 冷却後、反応液を水 50ml の入った分液ロートに移す
- 4) **エーテル 30ml を加え分液する**

水層 (下層)
(含硫酸、メタノール)

エーテル層 (上層) (含安息香酸、安息香酸メチル)

- 1) 水 25ml を加え洗う
- 2) **5%炭酸水素ナトリウム水溶液 25ml を加え洗う**

水層 (含安息香酸Na塩)

エーテル層 (含安息香酸メチル)

希塩酸 10ml を加え
酸性にする

- 1) 飽和食塩水で洗う
- 2) 無水硫酸ナトリウムを加え乾燥する
- 3) 自然ろ過後、エバポレーターで減圧濃縮

析出した結晶を吸引濾取
回収率を確認

常圧蒸留 (安息香酸メチル : bp 198-199°C)